双硫脲水相光度法测定药品中的钴

刘海玲 冯 兴

(桂林工学院材料工程系 541004)

摘 要 在 pH 9.0~9.5 的硼砂—NaOH 缓冲介质中, 钴与双硫脲形成 1:2 的紫红色配合物, 其最大吸收波长为 570nm, 在非离子表面活性剂 OP 存在下, 可直接在水相中实现钴的测定。方法的灵敏度为 $4.29 \times 10^4 \text{L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$, 钴(II) 含量在 0~15 $\mu\text{g}/25\text{mL}$ 符合比尔定律。可应用于药品中钴的测定

关键词 钴; 双硫脲; 光度分析法

分类号 O657.13

钴是人体健康必不可少的微量元素之一^[1], 随着人体科学研究的深入, 要求一种快速、准确、灵敏度高的方法以测定生物体、药物、环境水等中的微量钴。钴的测定方法已经有报导^[2~3], 而以常见显色剂双硫脲直接在水相中进行光度测定尚未见报道。实验表明, 在碱性缓冲体系硼砂, 硼砂 NaOH, $\text{Na}_2\text{CO}_3 - \text{NaHCO}_3$ 当有表面活性剂 OP、吐温 80, CTMAB 存在时, 钴与双硫脲形成一紫红色稳定配合物, 可以直接在水相中实现钴的测定。该方法条件宽容, 易于操作, 干扰较少。

1 实验部分

1.1 主要仪器与试剂

722 型光栅分光光度计; PHS-2 型酸度计; 钴标准溶液: $\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 用水直接配制 1g/L 钴(II) 标准储备液, 使用时以水逐级稀释配制成 10mg/L 钴标准工作液; 双硫脲溶液: $1.0 \times 10^{-3} \text{mol/L}$ 丙酮溶液; 表面活性剂溶液: 3% 的 OP, $1.0 \times 10^{-2} \text{mol/L}$ CTMAB, 5% 的吐温 80; 缓冲溶液: 按常法配制硼砂 (0.1mol/L), pH 9.0~9.5 的硼砂—NaOH 缓冲溶液, pH 9~10 的 $\text{Na}_2\text{CO}_3 - \text{NaHCO}_3$ 缓冲溶液。所用试剂均为分析纯, 水为蒸馏水。

1.2 实验方法

取适量钴标准工作液于 25mL 比色管中, 加水至 10mL, 加双硫脲溶液 2.0mL, 摇匀, 加入 OP 溶液 0.5mL, 硼砂—NaOH 缓冲溶液 7.0mL, 用水稀释至刻度, 摇匀, 2min 后于光度计上 570nm 处测定吸光度, 1cm 比色皿, 试剂空白为参比。

2 结果与讨论

2.1 测定条件的确定

实验了钴(II) 与双硫脲的反应环境, 发现在 pH 值为 8.5~11.0 的碱性环境中, Co

(II) 与双硫脲会迅速反应生成稳定的络合物，可以用稀硼砂溶液，硼砂—NaOH 缓冲溶液，Na₂CO₃—NaHCO₃ 缓冲溶液进行控制溶液的 pH，实验选择 pH 9.0~9.5 的硼砂—NaOH 介质为最佳条件；在该介质条件下，对各种表面活性剂进行了考察，结果表明，不加表面活性剂时，Co—双硫脲配合物的最大吸收波长为 570nm，但灵敏度较低，当加入适量的非离子表面活性剂 OP、Tween—80、阴离子表面活性剂 SDBS 或阳离子表面活性剂 CTMAB 时，配合物的最大吸收波长没有发生变化，仍在 570nm，但灵敏度均有不同程度的提高，说明表面活性剂对本体系具有增敏作用，进一步实验发现，增敏的原因不是因为生成了三元的胶束络合物，而是因为表面活性剂的加入大大降低了显色剂双硫脲的试剂空白值，从而使 Co—双硫脲配合物的吸光度相对增大所致，其中 OP 的增敏效果最大，本文选择 OP，所得吸收曲线见图 1。

实验确定的各试剂的最佳用量为：硼砂—NaOH 缓冲溶液 7.0~9.0mL，OP 0.5~3.0mL，双硫脲 1.0~3.0mL。各试剂的加入顺序对吸光度无影响。显色在 2min 内即可完成，室温下至少稳定 2h。钴含量在 0~15.0 μ g/25mL 范围内符合比尔定律，标准曲线的回归方程为 $A=0.0039+0.0291C$ (μ g/25mL)，相关系数为 0.9987，配合物的表现摩尔吸光系数 $\epsilon_{570}=4.29 \times 10^4 L \cdot mol^{-1} \cdot cm^{-1}$ 。用摩尔比法和等摩尔连续变化法测得配合物的组成为 Co (II) : 双硫脲 = 1 : 2。

2.2 共存组分的影响及干扰消除

对于 10.0 μ gCo (II) / 25mL 的测定，当相对误差 $\leq \pm 5\%$ 时，常见 20 多种共存离子的允许量 (以 mg 计) 分别为：K⁺，Na⁺，Ca²⁺，Mg²⁺ 1.5；Mo (VI)，W (VI)，Sn (VI)，Al³⁺ 0.8；Ni²⁺，Sb³⁺，Fe²⁺，Ag⁺ 0.5；Se⁴⁺，Nb (V)，Zr (IV)，Ti (IV) 0.2。Fe³⁺，Cr³⁺，Pb²⁺，Cd²⁺，V (V)，Cu²⁺，Mn²⁺，Zn²⁺ 等量时干扰 Co²⁺ 的测定，大量的 F⁻，Cl⁻，I⁻，SO₄²⁻，PO₄³⁻，柠檬酸根，酒石酸根，抗坏血酸不干扰测定。三乙醇胺和 F⁻ 共存时，可使 Fe³⁺ 的允许量提高到 200 μ g，酒石酸钾钠的加入可使 Mn²⁺，Pb²⁺ 的允许量提高到 100 μ g。对于组成简单的样品，只需加入适量掩蔽剂即可进行钴的测定。

3 分析应用

准确称取维生素 B₁₂ 药片或注射液 0.5~1.5g，放在 50mL 烧杯中，加入 15mL 硝酸，3mL 高氯酸于电热板上慢慢加热进行消解，当高氯酸白烟冒完后取下冷却，加入 5mL 0.1mol/L HCl 溶解残渣，转入 50mL 容量中，用水稀释至刻度，摇匀。取该溶液 5.0~10.0mL 于 25mL 比色管中，加几滴稀 NaOH 使其 pH 约为 6，加入 1.5mL 酒石酸钾钠 (0.5mol/L) 2.0mL NaF (10%)，其余按实验方法操作，同时制作工作曲线并做加标回收实验。结果见表 1。

图 1 吸收曲线

Fig. 1 Absorption curve
 1—双硫脲 (对水)；2—双硫脲+OP (对水)；
 1'—Co²⁺ (10 μ g) + 双硫脲 (对 1)；
 2'—Co²⁺ (10 μ g) + 双硫脲+OP (对 2)

原子吸收法分析结果 $V_{B_{12}}$ 药片为 10.54×10^{-6} , $V_{B_{12}}$ 针剂为 24.03×10^{-6} , 和本法结果吻合。

本文建立的测钴方法操作十分简便, 成本很低, 适合于药物等组成简单的样品分析。

表 1 样品分析结果

Table 1 Analytic result of samples					$w_{Co}/10^{-6}$
样品	Co 含量	加入钴量	测得钴量	回收率/%	RSD%
$V_{B_{12}}$ 药片	10.40	3.0	13.55	105	3.34
	10.70	3.0	13.79	103	
	10.10	3.0	13.46	102	
	10.90	3.0	14.02	104	
$V_{B_{12}}$ 针剂	23.89	3.0	26.86	99	0.36
	24.00	3.0	26.94	98	
	24.08	3.0	26.93	95	
	23.96	3.0	26.87	97	

参 考 文 献

- 1 孔祥瑞. 必需微量元素的营养生理及临床意义. 合肥: 安徽科学技术出版社, 1982: 266
- 2 刘海玲, 周洪涛. 四(4-三甲氨基)叶啉与钴配合物的吸附波探讨. 理论检验(化学分册), 1993, 29(1): 21
- 3 夏道沛. Co 与邻硝基苯基荧光酮. CPB, OP的显色反应. 冶金分析, 1992, 12(2): 10

DETERMINATION OF COBALT WITH DITHIZONE

Liu Hailing Feng Xing

(Department of Material Engineering, Guilin Institute of Technology)

Abstract It is found that cobalt reacts with dithizone in $Na_2B_4O_7-NaOH$ medium to form a red-violet complex with a maximum absorption at 570nm. apparent molar absorptivity is $4.29 \times 10^4 L \cdot mol^{-1} \cdot cm^{-1}$, molar ratio of cobalt to dithizone is 1:2 and Beer's Law is obeyed in the range of $0 \sim 25 \mu g Co / 25 mL$. The method may be applied to the determination of cobalt in $V_{B_{12}}$.

Key words cobalt; dithizone; spectrophotometry